

Troubles de l'alimentation à l'âge de 2 ans après une naissance prématurée et facteurs associés

Section : Santé

Code d'identification : 1079

Porteur du projet, laboratoire de rattachement
Kaat Philippe, University College Dublin & Adrien Aubert, Inserm, Paris

Résumé
Les comportements alimentaires des jeunes enfants après l'âge de 2 ans restent encore peu étudiés, alors que cette période est cruciale dans leur développement. C'est souvent à cet âge que surgissent des difficultés alimentaires, telles que le refus de s'alimenter ou les troubles oromoteurs, qui peuvent avoir des conséquences sur la croissance et la santé de l'enfant. Ces troubles semblent plus fréquents chez les enfants nés prématurément, mais les données restent limitées. Cette étude vise à mieux comprendre les comportements alimentaires à 2 ans en comparant deux cohortes françaises : des enfants nés prématurément (Epipage 2 : <35 semaines de gestation ; Elfe : 33-36 semaines de gestation) et des enfants nés à terme (Elfe : 37-41 semaines de gestation). Elle a pour objectifs de comparer la fréquence et la nature des difficultés alimentaires selon l'âge gestationnel, et d'identifier les facteurs associés (facteurs néonataux, cognitifs, familiaux, etc.) afin de mieux cibler les actions de prévention et de soutien.